

## Un programa de servicios para el paciente personalizado e integral para pacientes con acromegalia.

### PARA NOSOTROS, EL APOYO AL PACIENTE ES ALGO PERSONAL



Como parte del Programa de apoyo y acceso del paciente de Chiasma, también conocido como “CAPS”, usted es nuestra máxima prioridad. El programa integral, el apoyo y la comunicación personal están adaptados a sus necesidades, su horario y sus preferencias de comunicación.

Esperamos ser un colaborador en su proceso de tratamiento y para su éxito con las cápsulas orales de liberación prolongada MYCAPSSA® (octreotida).



### NUESTRO EQUIPO DE ESPECIALISTAS EN CUIDADO DEL PACIENTE

Todo es personal. Es por esto que su Especialista del cuidado del paciente estará en todo el proceso para ayudar a hacer que acceder, comenzar y continuar con el tratamiento con MYCAPSSA sea lo más sencillo posible.

Su Especialista del cuidado del paciente personal ayudará a facilitar la comunicación entre usted, su médico, su farmacia especializada y su compañía de seguros para hacer que la transición a MYCAPSSA sea agradable.



Con el tiempo, he aprendido que no estoy solo en mi recorrido con la acromegalia. Permitirme confiar en el apoyo y la pericia de otros forma parte del éxito de mi tratamiento.

**-Traci, paciente con acromegalia**



## INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### ¿Para qué sirve MYCAPSSA (octreotida)?

MYCAPSSA es un medicamento oral que se obtiene con receta y se usa en el tratamiento de mantenimiento a largo plazo de la acromegalia en personas en las que el tratamiento inicial con octreotida o lanreotida ha sido eficaz y tolerado.

Si estos tratamientos son eficaces y el cuerpo los tolera, usted puede ser elegible para tomar MYCAPSSA en lugar de las inyecciones. Pregunte a su médico si este tratamiento oral es adecuado para usted.

### ¿Cuál es la información de seguridad más importante que debo saber?

MYCAPSSA puede causar problemas con la vesícula biliar. Informe a su proveedor del cuidado de la salud si tiene alguno de estos síntomas: dolor repentino en la parte superior derecha del estómago (abdomen) o

en el hombro derecho o entre los omóplatos, coloración amarillenta de la piel o en la parte blanca de los ojos, fiebre con escalofríos o náuseas.

MYCAPSSA puede afectar sus niveles de azúcar en sangre, de hormona tiroidea y de vitamina B12. Informe a su proveedor del cuidado de la salud si tiene algún problema o afección relacionada con estos. Su proveedor del cuidado de la salud puede vigilar estos niveles durante su tratamiento con MYCAPSSA.

Informe a su proveedor del cuidado de la salud si tiene frecuencia cardíaca irregular.

### ¿Quién no debe usar MYCAPSSA?

MYCAPSSA puede causar una reacción alérgica grave, incluido un choque anafiláctico. Deje de tomar MYCAPSSA de inmediato y busque ayuda de emergencia si tiene alguno de estos síntomas: inflamación de la lengua, de la garganta, de los labios, de los ojos o de la cara, problemas para tragar o para respirar, picazón intensa de la piel con sarpullido o protuberancias elevadas, sensación de desmayo, dolor en el pecho o frecuencia cardíaca rápida.

## NUESTRO APOYO



### ACCESO FÁCIL

- **Asistencia financiera** para gastos de bolsillo, incluidas la asistencia para el copago y derivaciones a otras fuentes de apoyo.
- **Investigación de beneficios** para comprender mejor su cobertura de seguro para MYCAPSSA y cómo podemos ayudar.
- **Interacción con la farmacia especializada** para asegurar la preparación y entrega en el momento y lugar apropiados.
- **Programa de asistencia al paciente** para personas sin seguro o que cumplan otros requisitos de elegibilidad.



### COMENZAR CON MYCAPSSA

- **Consejos para el éxito** de su Especialista del cuidado del paciente en todo el proceso de transición que hace que MYCAPSSA sea una parte de su rutina diaria y que vivir con acromegalia sea más fácil.



### COLABORACIÓN CONTINUA

- **Nuestro trabajo no termina cuando usted comienza** a tomar MYCAPSSA. Continuaremos contactándolo, en sus términos y su horario. Estamos aquí para guiarlo en su nueva rutina de tratamiento y nos aseguraremos de que se respondan sus preguntas. Lo contactaremos para saludarlo, saber cómo está y **ofrecer nuestro apoyo en lo que podamos ayudarle.**

### \$0 DE GASTOS DE BOLSILLO\*

**Todos los pacientes elegibles asegurados comercialmente pueden obtener MYCAPSSA por \$0 de gastos de bolsillo.**

**Para obtener más información sobre cómo unirse al programa CAPS y comenzar con MYCAPSSA, llame a nuestros Especialistas del cuidado del paciente al**

**1-833-3GO-CAPS (1-833-346-2277), de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 7 p.m., hora del este.**

### INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)

No use MYCAPSSA si es alérgico a la octreotida o a cualquier otro ingrediente presente en MYCAPSSA. Si necesita saber cuáles son los ingredientes, pregunte a su proveedor del cuidado de la salud o farmacéutico.

Si tiene ciertas afecciones médicas, debe usar MYCAPSSA con precaución. Informe a su proveedor del cuidado de la salud sobre todas sus afecciones médicas, especialmente las siguientes: embarazo o lactancia, hepatopatía, nefropatía o dificultad para vaciar la vejiga completamente.

Informe a su proveedor del cuidado de la salud sobre todos los medicamentos que tome. MYCAPSSA puede afectar la manera en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa MYCAPSSA.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MYCAPSSA?

Los efectos secundarios más comunes son dolor de cabeza, artralgia, náuseas, debilidad, diarrea y sudoración excesiva.

**Informe a su proveedor del cuidado de la salud si tiene cualquier efecto secundario que le incomode o que no desaparezca. Puede reportar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los Estados Unidos al 1-800-FDA-1088.**

Mantenga MYCAPSSA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### ¿Cómo debo tomar MYCAPSSA?

No tome MYCAPSSA con alimentos. MYCAPSSA se debe tomar con un vaso de agua con el estómago vacío. Tome MYCAPSSA por lo menos 1 hora antes o por lo menos 2 horas después de una comida (por ejemplo, puede tomar su dosis matutina 1 hora antes del desayuno y su dosis nocturna a la hora de acostarse).

Para obtener más información consulte la [Información para el paciente](#) completa.

**\*Términos y condiciones:** Solo válida para los pacientes asegurados comercialmente en los 50 estados de los Estados Unidos, Washington D.C. y Puerto Rico por medio del servicio de entrega directa o las farmacias minoristas designadas. No es elegible si las recetas las paga en parte o en su totalidad el Estado o programas financiados por el Gobierno federal como Medicare Parte D, Medicaid, Asuntos de Veteranos, Departamento de Defensa o Tricare, ni donde esté prohibido por ley. LA OFERTA NO ES UN SEGURO. La oferta no se puede vender, comprar, negociar, transferir, y no se puede combinar con ninguna otra oferta. Las tarjetas de descuento por pago en efectivo no son elegibles para usarse en este programa.

