

# PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE



**Mycapssa**<sup>®</sup>  
(octreotrida) cápsulas de  
20 mg

# PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE



## ¿Las cápsulas orales de liberación prolongada MYCAPSSA® (octreotida) reemplazan a mi inyección actual del análogo de la somatostatina (SSA) inyectable?

MYCAPSSA es un medicamento oral que se obtiene con receta y está aprobado para su uso en el tratamiento de mantenimiento a largo plazo de la acromegalia en personas en las que el tratamiento inicial con octreotida o lanreotida ha sido eficaz y tolerado.

Si estos tratamientos son eficaces y el cuerpo los tolera, usted puede ser elegible para tomar MYCAPSSA en lugar de las inyecciones.



## ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de MYCAPSSA?

Los efectos secundarios más comunes de MYCAPSSA son dolor de cabeza, artralgia, náuseas, debilidad, diarrea y sudoración excesiva.



## ¿Cómo actúan las cápsulas MYCAPSSA?

El principio activo de MYCAPSSA es la octreotida, un medicamento muy conocido y probado. Las cápsulas MYCAPSSA, diseñadas con tecnología Transient Permeability Enhancer (TPE®), tienen un recubrimiento especial en cada cápsula que protege el medicamento octreotida en el interior.

Cuando se traga con agua, este recubrimiento impide que el medicamento se libere muy pronto o se degrade antes de que llegue a donde necesita estar. El recubrimiento mantiene la octreotida intacta hasta que pueda llegar al lugar correcto en el cuerpo, el intestino delgado, para permitir que el medicamento comience a hacer su trabajo.



## ¿MYCAPSSA puede ayudar a mantener mis niveles de IGF-I y GH?

Sí, MYCAPSSA mostró mantener de manera eficaz los niveles normales de IGF-I y GH en la mayoría de los pacientes.



## ¿Qué puedo esperar en la transición al tratamiento con MYCAPSSA?

Una vez que haya comenzado con MYCAPSSA, su médico puede decidir ajustar o no el número de cápsulas que tome cada día según sus niveles de la hormona IGF-I y sus signos y síntomas de la acromegalia.

Asegúrese de tener un diálogo abierto sobre cómo se siente y comuníquelo a su médico cómo le está funcionando MYCAPSSA. Esto ayudará a asegurar que reciba la cantidad adecuada de medicamento para tratar la acromegalia de manera adecuada.



## ¿Cómo tomo MYCAPSSA?

Es importante programar su dosis de MYCAPSSA en torno a las comidas. Siempre debe tomarse cada dosis de MYCAPSSA con el estómago vacío y solo con un vaso de agua. No beba ni ingiera nada, excepto agua, durante 2 horas antes de tomar MYCAPSSA y 1 hora después. Eso significa que no debe haber ningún alimento en el estómago durante un total de 3 horas con cada dosis de MYCAPSSA.



## ¿Por qué es tan importante tomar mis dosis de MYCAPSSA en un horario regular?

Omitir una dosis puede impedir que el cuerpo reciba la cantidad necesaria de octreotida cada día. Es importante que se mantenga al día y le dé a su cuerpo la cantidad correcta de medicamento que necesita para tratar la acromegalia.



## ¿Qué pasa si olvido tomar una dosis?

Si omite una dosis de MYCAPSSA, no tome la dosis que omitió más tarde. Simplemente tome su próxima dosis a la hora programada.

Llame a su médico de inmediato si está teniendo problemas para tomar sus dosis de manera regular. No tomar MYCAPSSA regularmente puede afectar cómo se siente y qué tan bien le funciona el medicamento.



## ¿Puedo tener alimentos, café u otra bebida en el estómago cuando tome MYCAPSSA?

No beba ni ingiera nada, excepto agua, 2 horas antes de tomar MYCAPSSA y 1 hora después.

Si come dentro de las 2 horas previas o 1 hora después de tomar MYCAPSSA, puede que el fármaco no tenga el efecto que desea. Puede ser que el fármaco no se absorba correctamente en el cuerpo. Programe la toma de MYCAPSSA en torno a los horarios de las comidas.



## ¿Cómo recibiré MYCAPSSA?

Recibirá MYCAPSSA mensualmente en su casa. Su Especialista del cuidado del paciente del Programa de apoyo y acceso del paciente de Chiasma (Chiasma Access & Patient Support, CAPS) lo ayudará a coordinar con su farmacia especializada la entrega de MYCAPSSA en el lugar y momento en que sea más cómodo, y recibirá una llamada de la farmacia para confirmar el envío.



## ¿Recibiré recordatorios de reabastecimiento para garantizar que reciba MYCAPSSA cada mes?

¡Sí! Su farmacia especializada lo ayudará a mantenerse al día con sus reabastecimientos de MYCAPSSA. Su farmacia lo contactará cada mes para coordinar un horario de entrega conveniente de su reabastecimiento. Si surge cualquier pregunta o duda, siempre puede contactar a su Especialista del cuidado del paciente de CAPS para obtener más asistencia.



## ¿Cómo debo guardar MYCAPSSA?

Antes del primer uso, guarde los pastilleros de MYCAPSSA que no estén abiertos en una heladera. Asegúrese de no congelar MYCAPSSA. Después del primer uso de cada pastillero, puede guardar los pastilleros que estén abiertos a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (20 °C a 25 °C), durante hasta 1 mes. Asegúrese de guardar MYCAPSSA en un lugar seguro y siempre fuera del alcance de los niños.

## INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### ¿Para qué sirve MYCAPSSA (octreotida)?

MYCAPSSA es un medicamento oral que se obtiene con receta y se usa en el tratamiento de mantenimiento a largo plazo de la acromegalia en personas en las que el tratamiento inicial con octreotida o lanreotida ha sido eficaz y tolerado.

Si estos tratamientos son eficaces y el cuerpo los tolera, usted puede ser elegible para tomar MYCAPSSA en lugar de las inyecciones. Pregunte a su médico si este tratamiento oral es adecuado para usted.

### ¿Cuál es la información de seguridad más importante que debo saber?

MYCAPSSA puede causar problemas con la vesícula biliar. Informe a su proveedor del cuidado de la salud si tiene alguno de estos síntomas: dolor repentino en la parte superior derecha del estómago (abdomen) o en el hombro derecho o entre los omóplatos, coloración amarillenta de la piel o de la parte blanca de los ojos, fiebre con escalofríos o náuseas.

MYCAPSSA puede afectar sus niveles de azúcar en sangre, de las hormonas tiroideas y de la vitamina B12. Informe a su proveedor del cuidado de la salud si tiene algún problema o afección relacionada con estos. Su proveedor del cuidado de la salud puede vigilar estos niveles durante su tratamiento con MYCAPSSA. Informe a su proveedor del cuidado de la salud si tiene frecuencia cardíaca irregular.

### ¿Quién no debe usar MYCAPSSA?

MYCAPSSA puede causar una reacción alérgica, grave incluido el choque anafiláctico. Deje de tomar MYCAPSSA de inmediato y busque ayuda de emergencia si tiene alguno de estos síntomas: inflamación de la lengua, de la garganta, de los labios, de los ojos o de la cara, problemas para tragar o para respirar, picazón intensa de la piel con sarpullido o protuberancias elevadas, sensación de desmayo, dolor en el pecho o frecuencia cardíaca rápida.

No use MYCAPSSA si es alérgico a la octreotida o a cualquier otro ingrediente presente en MYCAPSSA. Si necesita saber cuáles son los ingredientes, pregunte a su proveedor del cuidado de la salud o a su farmacéutico.

Si tiene otras afecciones médicas determinadas, debe usar MYCAPSSA con precaución. Informe a su proveedor del cuidado de la salud sobre todas sus afecciones médicas, especialmente las siguientes: embarazo o lactancia, hepatopatía, nefropatía o dificultad para vaciar la vejiga completamente.

Informe a su proveedor del cuidado de la salud sobre todos los medicamentos que tome. MYCAPSSA puede afectar la manera en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa MYCAPSSA.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MYCAPSSA?

Los efectos secundarios más comunes son dolor de cabeza, artralgia, náuseas, debilidad, diarrea y sudoración excesiva.

**Informe a su proveedor del cuidado de la salud si tiene cualquier efecto secundario que le incomode o que no desaparezca. Puede reportar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los Estados Unidos al 1-800-FDA-1088.**

Mantenga MYCAPSSA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### ¿Cómo debo tomar MYCAPSSA?

No tome MYCAPSSA con alimentos. MYCAPSSA se debe tomar con un vaso de agua con el estómago vacío. Tome MYCAPSSA por lo menos 1 hora antes o por lo menos 2 horas después de una comida (por ejemplo, puede tomar su dosis matutina 1 hora antes del desayuno y su dosis nocturna a la hora de acostarse).

Consulte la  
Información para el  
paciente completa.



“

Lo que recomiendo y aconsejo a los pacientes es que investiguen lo más posible para informarse. El conocimiento es poder y necesitan protegerse a sí mismos. Ante todo, necesitan cuidarse a sí mismos.

”

**SUSAN,**  
**paciente con acromegalia**



**CHIASMA**®

©2020 Chiasma, Inc. Todos los derechos reservados.  
Chiasma, MYCAPSSA, CAPS y TPE son marcas registradas de  
Chiasma, Inc. PM-MC-US-0266 11/2020