



Mycapssa[®]

(octreotrida) cápsulas de
20 mg

**VERIFICADOR
DE SÍNTOMAS**

DAR SEGUIMIENTO A CUALQUIER CAMBIO



Es importante dar seguimiento a cómo las cápsulas orales de liberación prolongada MYCAPSSA® (octreotida) están funcionando y anotar cualquier cambio en su afección o síntomas durante su transición a MYCAPSSA. Hacerlo puede ayudar a asegurarse de que reciba la cantidad correcta de MYCAPSSA para tratar la acromegalia.

Mientras evalúa su experiencia con MYCAPSSA, piense en sus síntomas antes de comenzar con MYCAPSSA. Use eso como un punto de referencia. Después, dé seguimiento a sus síntomas durante los siguientes 3 meses mientras comienza su tratamiento con MYCAPSSA.

Lleve su verificador a la siguiente cita con su médico para hablar de su experiencia con su equipo de cuidado de la salud. Dar seguimiento a sus síntomas y hablar de ellos con su equipo de cuidado de la salud es un paso en la dirección correcta hacia el control de la acromegalia.

FATIGA

A medida que hace la transición a MYCAPSSA, tómese un tiempo para pensar sobre su experiencia con los síntomas de fatiga antes de comenzar con MYCAPSSA.

¿Cuáles eran y cómo se sentía? ¿Se sentía cansado durante el día, incluso después de dormir durante una noche entera?

En el transcurso de los siguientes 3 meses, tome nota de cómo iniciar el tratamiento con MYCAPSSA ha afectado sus síntomas de fatiga. Asegúrese de anotar cualquier similitud o diferencia en su experiencia antes de comenzar con MYCAPSSA para que pueda compartir esa información en la siguiente cita con su equipo de cuidado de la salud.

DOLORES DE CABEZA

Ahora piense en los dolores de cabeza. **Antes de comenzar con MYCAPSSA, ¿qué tan seguido tenía dolores de cabeza?** ¿Tenía dolores de cabeza que duraban todo el día o varios días aún con intervención (p. ej., medicamentos, masajes, descanso)?

En el transcurso de los siguientes 3 meses, tome nota de cómo iniciar el tratamiento con MYCAPSSA ha afectado su experiencia con los dolores de cabeza. Asegúrese de anotar cualquier similitud o diferencia en su experiencia antes de comenzar con MYCAPSSA para que pueda compartir esa información en la siguiente cita con su equipo de cuidado de la salud.

ARTOMIALGIAS GENERALIZADAS Y ARTRALGIA

Ahora reflexionemos sobre las artromialgias generalizadas y la artralgia. **Antes del tratamiento con MYCAPSSA, ¿con qué frecuencia experimentaba artromialgias generalizadas o artralgia no relacionadas con actividad física extrema o lesión muscular?** ¿Qué tan graves eran sus síntomas? ¿Duraban todo el día?

En el transcurso de los siguientes 3 meses, tome nota de cómo iniciar el tratamiento con MYCAPSSA ha afectado su experiencia con las artromialgias generalizadas o con la artralgia. Asegúrese de anotar cualquier similitud o diferencia en su experiencia antes de comenzar con MYCAPSSA para que pueda compartir esa información en la siguiente cita con su equipo del cuidado de la salud.

DAR SEGUIMIENTO A SUS SÍNTOMAS A TRAVÉS DEL TIEMPO

Cuando ve los resultados de dar seguimiento a sus síntomas antes y después de comenzar el tratamiento con MYCAPSSA, ¿han cambiado los síntomas y la experiencia con el tratamiento? De ser así, ¿de qué manera son diferentes y qué significa eso para usted en su proceso de tratamiento?

Tómese algunos minutos para reflexionar sobre esto antes de la siguiente cita con su médico. Hacerlo puede ayudarlo a prepararse y sacar el máximo provecho de su tiempo con su equipo del cuidado de la salud.

INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Para qué sirve MYCAPSSA (octreotida)?

MYCAPSSA es un medicamento oral que se obtiene con receta y se usa en el tratamiento de mantenimiento a largo plazo de la acromegalia en personas en las que el tratamiento inicial con octreotida o lanreotida ha sido eficaz y tolerado.

Si estos tratamientos son eficaces y el cuerpo los tolera, usted puede ser elegible para tomar MYCAPSSA en lugar de las inyecciones. Pregunte a su médico si este tratamiento oral es adecuado para usted.

¿Cuál es la información de seguridad más importante que debo saber?

MYCAPSSA puede causar problemas con la vesícula biliar. Informe a su proveedor del cuidado de la salud si tiene alguno de estos síntomas: dolor repentino en la parte superior derecha del estómago (abdomen) o en el hombro derecho o entre los omóplatos, coloración amarillenta de la piel o en la parte blanca de los ojos, fiebre con escalofríos o náuseas.

MYCAPSSA puede afectar sus niveles de azúcar en sangre, de hormona tiroidea y de vitamina B12. Informe a su proveedor del cuidado de la salud si tiene algún problema o afección relacionada con estos. Su proveedor del cuidado de la salud puede vigilar estos niveles durante su tratamiento con MYCAPSSA.

Informe a su proveedor del cuidado de la salud si tiene frecuencia cardíaca irregular.

¿Quién no debe usar MYCAPSSA?

MYCAPSSA puede causar una reacción alérgica grave, incluido un choque anafiláctico. Deje de tomar MYCAPSSA de inmediato y busque ayuda de emergencia si tiene alguno de estos síntomas: inflamación de la lengua, de la garganta, de los labios, de los ojos o de cara, problemas para tragar o para respirar, picazón intensa de la piel con sarpullido o protuberancias elevadas, sensación de desmayo, dolor en el pecho o frecuencia cardíaca rápida.

INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)

No use MYCAPSSA si es alérgico a la octreotida o a cualquier otro ingrediente presente en MYCAPSSA. Si necesita saber cuáles son los ingredientes, pregunte a su proveedor del cuidado de la salud o a su farmacéutico.

Si tiene ciertas afecciones médicas, debe usar MYCAPSSA con precaución. Informe a su proveedor de cuidado de la salud sobre todas sus condiciones médicas, especialmente las siguientes: embarazo o lactancia, hepatopatía, nefropatía o dificultad para vaciar la vejiga completamente.

Informe a su proveedor del cuidado de la salud sobre todos los medicamentos que tome. MYCAPSSA puede afectar la manera en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa MYCAPSSA.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MYCAPSSA?

Los efectos secundarios más comunes son dolor de cabeza, artralgias, náusea, debilidad, diarrea y sudoración excesiva.

Informe a su proveedor del cuidado de la salud si presenta algún efecto secundario que le incomode o que no desaparezca. Puede reportar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los Estados Unidos al 1-800-FDA-1088.

Mantenga MYCAPSSA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

¿Cómo debo tomar MYCAPSSA?

No tome MYCAPSSA con alimentos. MYCAPSSA se debe tomar con un vaso de agua con el estómago vacío. Tome MYCAPSSA por lo menos 1 hora antes o por lo menos 2 horas después de una comida (por ejemplo, puede tomar su dosis matutina 1 hora antes del desayuno y su dosis nocturna a la hora de acostarse).

Consulte la
Información para el
paciente completa.



“

Mi proceso de tratamiento me ha permitido conocer a los médicos y enfermeros más extraordinarios. Hemos establecido nuestra relación al repasar punto por punto mis preguntas y al tener conversaciones honestas que les permiten conocerme a mí y a mi acromegalia. Es agradable sentirse parte del equipo que está manejando mi experiencia de tratamiento.

”

Ellen

ELLEN
Paciente con acromegalia



CHIASMA®

©2020 Chiasma, Inc. Todos los derechos reservados.
Chiasma y MYCAPSSA son marcas registradas de
Chiasma, Inc. PM-MC-US-0271 11/2020